

ІСНУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ БІЖУЧИХ ХВИЛЬ ДЛЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНО ЗВ'ЯЗАНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ

We consider a system of differential equations that describes the dynamics of an infinite system of nonlinearly coupled nonlinear oscillators on the $2d$ -lattice. By the method of critical points, we obtain a result on existence of the solitary traveling waves.

Рассматривается система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая динамику бесконечной системы нелинейно связанных нелинейных осцилляторов на двумерной решетке. С помощью метода критических точек получен результат о существовании уединенных бегущих волн.

1. Вступ. У цій статті будемо розглядати рівняння, які описують динаміку нескінченної системи нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на плоскій цілочисловій ґратці. Нехай $q_{n,m}(t)$ — узагальнена координата (n, m) -го осцилятора в момент часу t . Передбачається, що кожний осцилятор нелінійно взаємодіє з чотирма своїми найближчими сусідами. Тоді рівняння руху системи, що розглядається, мають вигляд

$$\ddot{q}_{n,m} = U'(q_{n+1,m} - q_{n,m}) - U'(q_{n,m} - q_{n-1,m}) + \\ + U'(q_{n,m+1} - q_{n,m}) - U'(q_{n,m} - q_{n,m-1}) - V'(q_{n,m}), \quad (n, m) \in \mathbb{Z}^2, \quad (1)$$

де $U, V \in C^1(\mathbb{R})$.

Рівняння (1) — це нескінченна система звичайних диференціальних рівнянь, причому при $V(r) \equiv 0$ (1) вони є двовимірним аналогом системи Фермі–Пасти–Улама, а при $V(r) = K(1 - \cos r)$ — дискретним рівнянням \sin -Гордона на двовимірній ґратці.

Важливим класом розв'язків для таких систем є біжучі хвилі. Досить детальні результати про біжучі хвилі в ланцюгах Фермі–Пасти–Улама можна знайти у працях О. Панкова, зокрема в [15] наведено найбільш повний огляд результатів. Результати досліджень таких систем із фізичної точки зору можна знайти в монографії [9]. У статті [6] встановлено умови існування періодичних біжучих хвиль у системі Фермі–Пасти–Улама на двовимірній ґратці. Водночас ланцюги осциляторів врозглядалися у кількох працях, зокрема в [12] результати отримано методами теорії біфуркацій, а в [1, 8] встановлено умови існування періодичних та відокремлених біжучих хвиль за допомогою методу критичних точок. У статтях [2, 5, 10, 11] вивчалися біжучі хвилі для систем лінійно зв'язаних осциляторів, розміщених на двовимірних ґратках. Зокрема, в [10] досліджувалися система із непарною 2π -періодичною нелінійністю, а в [11] взагалі розглядалися лінійні осцилятори. В статті [2] одержано умови існування періодичних і відокремлених біжучих хвиль. У статті [14] встановлено періодичні та гомоклінічні біжучі хвилі для нескінченного ланцюга нелінійно зв'язаних нелінійних частинок. У статті [7] одержано

результат про існування періодичних біжучих хвиль для дискретного рівняння \sin -Гордона на двовимірній ґратці, у статті [3] — результат про існування дозвукових періодичних біжучих хвиль для нескінченної системи нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів, розміщених на двовимірній ґратці, а у статті [4] — умови існування надзвукових хвиль для такої системи.

2. Постановка задачі. Зазначимо, що біжуча хвиля у двовимірному випадку має вигляд

$$q_{n,m}(t) = u(n \cos \varphi + m \sin \varphi - ct),$$

де функція неперервного аргументу $u(s)$ називається профілем, а константа $c \neq 0$ — швидкістю біжучої хвилі. Для її профілю $u(s)$, де $s = n \cos \varphi + m \sin \varphi - ct$, рівняння (1) набуває вигляду

$$c^2 u''(s) = U'(u(s + \cos \varphi) - u(s)) - U'(u(s) - u(s - \cos \varphi)) + \\ + U'(u(s + \sin \varphi) - u(s)) - U'(u(s) - u(s - \sin \varphi)) - V'(u(s)). \quad (2)$$

Скрізь далі під розв'язком рівняння (2) будемо розуміти функцію $u(s)$ класу $C^2(\mathbb{R})$, яка задовольняє рівняння (2) для всіх $s \in \mathbb{R}$.

Зазначимо, що в рівняння (2) швидкість c входить у квадраті. Звідси випливає, що якщо функція $u(s)$ задовольняє рівняння (2), то існують дві біжучі хвилі з даним профілем u та швидкостями $\pm c$.

Нас цікавлять відокремлені біжучі хвилі, профіль яких задовольняє крайову умову

$$\lim_{s \rightarrow \pm\infty} u(s) = u(\pm\infty) = 0. \quad (3)$$

Зауважимо, що такі хвилі називають ще гомоклінічними до нуля.

3. Варіаційне формулювання задачі. Позначимо через E гільбертів простір $H^1(\mathbb{R})$ зі скалярним добутком

$$(u, v) = \int_{-\infty}^{+\infty} (u(s)v(s) + u'(s)v'(s)) ds$$

і відповідною нормою $\|u\| = (u, u)^{\frac{1}{2}}$. Нагадаємо, що за теоремою вкладення $E \subset C_b(\mathbb{R})$, де $C_b(\mathbb{R})$ — простір обмежених неперервних функцій на \mathbb{R} . Більш того, функції з простору E мають нульову границю на нескінченності.

На просторі E означимо оператори

$$(Au)(s) := u(s + \cos \varphi) - u(s) = \int_s^{s+\cos \varphi} u'(\tau) d\tau, \\ (Bu)(s) := u(s + \sin \varphi) - u(s) = \int_s^{s+\sin \varphi} u'(\tau) d\tau.$$

Тоді справджується така лема (див. [6]).

Лема 1. Оператори A та B є обмеженими лінійними операторами, що задовольняють нерівності

$$\|Au\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq |\cos \varphi| \|u\|, \\ \|Bu\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq |\sin \varphi| \|u\|.$$

Скрізь далі будемо розглядати потенціали U і V вигляду

$$(i) \quad U(r) = \frac{c_0^2}{2}r^2 + f(r), \quad V(r) = -\frac{a^2}{2} + g(r), \quad \text{де } c_0 \geq 0, a > 0.$$

Також припускаємо, що неквадратична частина кожного з цих потенціалів $h \in \{f; g\}$ задовольняє такі умови:

$$(ii) \quad h(0) = h'(0) = 0 \text{ і } h'(r) = o(r) \text{ при } r \rightarrow 0;$$

$$(iii) \quad \text{існує } \mu > 2 \text{ таке, що}$$

$$0 \leq \mu h(r) \leq rh'(r), \quad r \neq 0.$$

Неважко переконатись у тому, що з цих умов випливає існування таких сталих $d > 0$ і $d_0 > 0$, що

$$h(r) \geq d|r|^\mu - d_0. \quad (4)$$

Далі нам знадобиться така лема (див. [4])

Лема 2. У зроблених припущеннях існує така неперервна монотонно зростаюча функція $\sigma(r)$, $r \geq 0$, що $\sigma(0) = 0$, $\lim_{r \rightarrow \infty} \sigma(r) = +\infty$ і

$$h'(r)r \leq \sigma(|r|)r^2. \quad (5)$$

На просторі E розглянемо функціонал

$$J(u) := \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \frac{c^2}{2} |u'(s)|^2 - U(Au(s)) - U(Bu(s)) - V(u(s)) \right\} ds.$$

Безпосередніми обчисленнями одержуємо наступні два твердження.

Лема 3. У зроблених припущеннях J — функціонал класу C^1 на E , а його похідна для будь-яких $u, v \in E$ виражається формулою

$$\langle J'(u), v \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \{ c^2 u'(s)v'(s) - U'(Au(s))Av(s) - U'(Bu(s))Bv(s) - V'(u(s))v(s) \} ds.$$

Лема 4. Критичні точки функціонала $J \in C^2$ -розв'язками рівняння (2), що задовольняють умову (3).

Лема 5. Нехай виконуються умови (i)–(iii). Тоді існують такі $\varepsilon > 0$ і $\gamma > 0$, що для нетривіальних критичних точок функціонала J справджуються нерівності

$$\varepsilon_0 \leq \|u\|^2 \leq \gamma J(u). \quad (6)$$

Доведення. Нехай $u \in E$ — критична точка функціонала J . Тоді $J'(u) = 0$ і

$$\begin{aligned} J(u) &= J(u) - \frac{1}{\mu} \langle J'(u), u \rangle = \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\mu} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \{ c^2 |u'(s)|^2 - c_0^2 |Au(s)|^2 - c_0^2 |Bu(s)|^2 + a^2 |u(s)|^2 \} ds - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left[f(Au(s)) - \frac{1}{\mu} f'(Au(s))Au(s) \right] + \left[f(Bu(s)) - \frac{1}{\mu} f'(Bu(s))Bu(s) \right] \right\} ds - \\
& \quad - \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ g(u(s)) - \frac{1}{\mu} g'(u(s))u(s) \right\} ds \geq \\
& \geq \frac{\mu-2}{2\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} \{ c^2 |u'(s)|^2 - c_0^2 |Au(s)|^2 - c_0^2 |Bu(s)|^2 + a^2 |u(s)|^2 \} ds.
\end{aligned}$$

Використовуючи лему 1, маємо

$$J(u) \geq \frac{\mu-2}{2\mu} \left\{ \alpha_0 \int_{-\infty}^{+\infty} |u'(s)|^2 ds + a^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |u(s)|^2 ds \right\},$$

де $\alpha_0 = c^2 - c_0^2$. Тоді

$$J(u) \geq \frac{\mu-2}{2\mu} \alpha_1 \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} |u'(s)|^2 ds + \int_{-\infty}^{+\infty} |u(s)|^2 ds \right\} = \frac{\mu-2}{2\mu} \alpha_1 \|u\|^2,$$

де $\alpha_1 = \min\{\alpha_0, a^2\}$. Звідси випливає друга з нерівностей (6).

Доведемо першу з нерівностей (6). Для критичної точки $u \in E$ маємо $\langle J'(u), u \rangle = 0$, тобто

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \{ c^2 |u'(s)|^2 - c_0^2 |Au(s)|^2 - c_0^2 |Bu(s)|^2 + a^2 |u(s)|^2 \} ds = \int_{-\infty}^{+\infty} \{ f'(u(s)) + g'(u(s)) \} u(s) ds.$$

Звідси, як і вище, отримуємо

$$\alpha_1 \|u\|^2 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \{ f'(u(s)) + g'(u(s)) \} u(s) ds. \quad (7)$$

За лемою 2, враховуючи нерівність (5), одержуємо

$$(f'(r) + g'(r))r \leq \tilde{\sigma}(|r|)r^2,$$

де $\tilde{\sigma}(r)$ — монотонно зростаюча неперервна функція від $r \geq 0$ і $\tilde{\sigma}(0) = 0$. Тоді з (7) випливає, що

$$\alpha_1 \|u\|^2 \leq \tilde{\sigma}(\|u\|_{C_b(\mathbb{R})}) \int_{-\infty}^{+\infty} \|u(s)\|^2 ds.$$

За теоремою вкладення

$$\|u\|_{C_b(\mathbb{R})} \leq C \|u\|.$$

Отже,

$$\alpha_1 \|u\|^2 \leq \tilde{\sigma}(C\|u\|) \|u\|^2.$$

Оскільки $u \neq 0$, то

$$\tilde{\sigma}(C\|u\|) \geq \alpha_1,$$

звідки випливає перша з нерівностей (6) з $\varepsilon_0^{\frac{1}{2}} = C^{-1} \cdot \tilde{\sigma}(\alpha_1)$.

Лему 5 доведено.

4. Основний результат. Для одержання основного результату цієї статті нам знадобиться наступна теорема (див. [4], теорема 2), в якій встановлено існування періодичних біжучих хвиль.

Теорема 1. *Нехай виконуються умови (i)–(iii). Тоді для будь-яких $k \geq 1$ і $c > c_0$ рівняння (2) має $2k$ -періодичний розв'язок. Тим самим існують дві періодичні біжучі хвилі з профілем u і швидкостями $\pm c$. Більш того, існують такі сталі $\varepsilon_0 > 0$ і $C > 0$, які не залежать від k , що*

$$\varepsilon_0 \leq \|u\|_k^2 \leq C, \quad \varepsilon_0 \leq J_k(u) \leq C. \quad (8)$$

Для одержання цього результату на гільбертовому просторі $E_k = \{u \in H_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}) : u(s+2k) = u(s)\}$ зі скалярним добутком

$$(u, v) = \int_{-k}^k (u(s)v(s) + u'(s)v'(s)) ds$$

і відповідною нормою $\|u\|_k = (u, u)^{\frac{1}{2}}$ було розглянуто функціонал

$$J_k(u) := \int_{-k}^k \left\{ \frac{c^2}{2} |u'(s)|^2 - U(Au(s)) - U(Bu(s)) - V(u(s)) \right\} ds,$$

критичні точки якого є шуканими періодичними розв'язками. Цей функціонал задовольняє всі умови теореми про гірський перевал (див. [15, 16]), яка встановлює існування його критичних точок.

Доведемо тепер існування відокремлених біжучих хвиль з тими ж припущеннями, з якими встановлено існування періодичних хвиль (теорема 1). Біжучі хвилі в даному випадку знаходяться як критичні точки функціонала J . Функціонал J задовольняє частину умов теореми про гірський перевал. Однак, умова Пале–Смейла для цього функціонала не виконується. Тому критичні точки в даному випадку будуються іншим способом — за допомогою переходу до границі в критичних точках функціонала J_k .

Для доведення основного результату цієї статті знадобляться деякі попередні результати. Перший з них є відомим (див. [13]).

Лема 6. *Нехай ν_n — обмежена послідовність в E . Тоді якщо для деякого $r > 0$*

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} \int_{y-r}^{y+r} |\nu_n(s)|^2 ds \rightarrow 0, \quad (9)$$

то $\nu_n \rightarrow 0$ в $L^p(\mathbb{R})$ для будь-якого $p > 2$.

Далі знадобиться наступна модифікація цього результату.

Лема 7. Нехай $u_n \in E_{k_n}$, де $k_n \rightarrow \infty$ і $\|u_n\|_{k_n}$ є обмеженою. Тоді якщо для деякого $r > 0$

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} \int_{y-r}^{y+r} |u_n(s)|^2 ds \rightarrow 0, \quad (10)$$

то $\|u_n\|_{L^p(-k_n, k_n)} \rightarrow 0$ для будь-якого $p > 2$.

Доведення. Це твердження зводиться до попереднього таким чином. Позначимо через χ таку неперервну функцію на \mathbb{R} , що $\chi_n(s) = 1$ при $|s| \leq k_n$, $\chi_n(s) = 0$ при $|s| \geq k_n + 1$ і $\chi_n(s)$ є лінійною на відрізках $[-k_n - 1, -k_n]$ і $[k_n, k_n + 1]$. Очевидно, функція χ є диференційовною скрізь, крім точок $s = \pm k_n, \pm(k_n + 1)$, і $|\chi'_n(s)| \leq 1$.

Покладемо $\nu_n(s) = \chi_n(s)u_n(s)$. Тоді ν_n належить E і маємо носій на відрізку $[-k_n - 1, k_n + 1]$. Крім того,

$$\|\nu_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\chi_n(s)u_n(s)|^2 ds \leq \int_{-k_n-1}^{k_n+1} |u_n(s)|^2 ds \leq \int_{-2k_n}^{2k_n} |u_n(s)|^2 ds \leq 2\|u_n\|_{L^2(-2k_n, 2k_n)}^2.$$

Далі, згідно з формулою Лейбніца

$$\begin{aligned} \|\nu'_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 &= \|\chi_n u'_n + \chi'_n u_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \|\chi_n u'_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \|\chi'_n u_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 \leq \\ &\leq \left\{ \int_{-k_n-1}^{k_n+1} |u'_n(s)|^2 ds \right\}^{\frac{1}{2}} + \left\{ \int_{-k_n-1}^{k_n+1} |u_n(s)|^2 ds \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \\ &\leq \left\{ \int_{-2k_n}^{2k_n} |u'_n(s)|^2 ds \right\}^{\frac{1}{2}} + \left\{ \int_{-2k_n}^{2k_n} |u_n(s)|^2 ds \right\}^{\frac{1}{2}} = \\ &= \sqrt{2} \{ \|u'_n\|_{L^2(-2k_n, 2k_n)} + \|u_n\|_{L^2(-2k_n, 2k_n)} \}. \end{aligned}$$

Звідси випливає, що послідовність

$$\|\nu_n\|^2 = \|\nu_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 + \|\nu'_n\|_{L^2(\mathbb{R})}^2$$

є обмеженою.

Очевидно також, що із співвідношення (10) для u_n випливає співвідношення (9) для ν_n . Таким чином, згідно з лемою 6 $\|\nu_n\|_{L^p(\mathbb{R})} \rightarrow 0$. Однак

$$\|\nu_n\|_{L^p(\mathbb{R})}^p = \int_{-k_n-1}^{k_n+1} |\chi_n(s)u_n(s)|^p ds \geq \int_{-k_n}^{k_n} |u_n(s)|^p ds = \|u_n\|_{(-k_n, k_n)}^p,$$

і лему доведено.

Основним результатом цієї статті є така теорема.

Теорема 2. Нехай виконуються умови (i)–(iii). Тоді для будь-якого $c > c_0$ рівняння (2) має розв'язок $u \in E$. Тим самим існують дві відокремлені біжучі хвилі з профілем u і швидкостями $\pm c$.

Доведення. Виберемо довільну послідовність $k_n \rightarrow \infty$ і позначимо через $u_n \in E_{k_n}$ $2k_n$ -періодичний розв'язок рівняння (2), побудований в теоремі 1 при $k = k_n$.

Переходячи до підпослідовності, можна вважати, що існують такі $\delta, r > 0$ і послідовність $y_n \in \mathbb{R}$, що

$$\int_{y_n-r}^{y_n+r} |u_n(s)|^2 ds \geq \delta. \quad (11)$$

Дійсно, нехай це не так. Тоді для будь-якого $r > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{y \in \mathbb{R}} \int_{y-r}^{y+r} |u_n(s)|^2 ds = 0.$$

Крім того, згідно з нерівностями (8), послідовність $\|u_n\|_{k_n}$ є обмеженою. Звідси, згідно з лемою 7, випливає, що

$$\|u_n\|_{L^p(-k_n, k_n)} \rightarrow 0. \quad (12)$$

Далі, $J'_k(u_n) = 0$ і, отже, $\langle J'_k(u_n), u_n \rangle = 0$, тобто

$$\begin{aligned} & \int_{-k_n}^{k_n} \{c^2 |u'_n(s)|^2 - c_0^2 |Au_n(s)| - c_0^2 |Bu_n(s)| + a^2 |u_n(s)|\} ds = \\ & = \int_{-k_n}^{k_n} \{f'(Au_n(s))Au_n(s) + f'(Bu_n(s))Bu_n(s) + g'(u_n(s))u_n(s)\} ds. \end{aligned}$$

Звідси

$$\alpha_1 \|u_n\|_{k_n}^2 \leq \int_{-k_n}^{k_n} \{f'(Au_n(s))Au_n(s) + f'(Bu_n(s))Bu_n(s) + g'(u_n(s))u_n(s)\} ds. \quad (13)$$

За теоремою вкладення функції $u_n(s)$ неперервні і рівномірно по n обмежені, тобто існує таке $R > 0$, що $|u_n(s)| \leq R$. Зафіксуємо довільне $p > 2$. Згідно з умовою (iii), для будь-якого $\varepsilon > 0$ існує таке $C = C_\varepsilon$, що при $|r| \leq R$

$$|h'(r)| \leq \varepsilon|r| + C|r|^{p-1}, \quad h \in \{f, g\}.$$

Тоді з нерівності (13) маємо

$$\begin{aligned} \alpha_1 \|u_n\|_{k_n}^2 & \leq \varepsilon \int_{-k_n}^{k_n} |u_n(s)|^2 ds + C \int_{-k_n}^{k_n} |u_n(s)|^p ds = \\ & = \varepsilon \|u_n\|_{L^2(-k_n, k_n)}^2 + C \|u_n\|_{L^p(-k_n, k_n)}^p \leq \varepsilon \|u_n\|_{k_n}^2 + C \|u_n\|_{L^p(-k_n, k_n)}^p. \end{aligned}$$

Вибираючи тут $\varepsilon = \frac{\alpha_1}{2}$, отримуємо

$$\frac{\alpha_1}{2} \|u_n\|_{k_n}^2 \leq C \|u_n\|_{L^p(-k_n, k_n)}^p.$$

Тоді, згідно з (12), $\|u_n\|_{k_n} \rightarrow 0$, що суперечить першій нерівності у (8). Таким чином, нерівність (11) доведено.

Рівняння (2) інваріантне відносно зсувів. Тому якщо $u(s)$ — його розв'язок, то $u(s+y)$ — також розв'язок для будь-якого $y \in \mathbb{R}$. Отже, замінюючи $u_n(s)$ на $u_n(s+y)$, можна вважати, що (11) виконується з $y_n = 0$.

Оскільки $\|u_n\|_{k_n}$ обмежена, то, переходячи до підпоследовності, можна вважати, що $u_n \rightarrow u$ слабо в $H_{\text{loc}}^1(\mathbb{R})$, тобто слабо в $H^1(a, b)$ для будь-якого скінченного інтервалу (a, b) . Згідно з теоремою вкладення, $u_n \rightarrow u$ рівномірно на будь-якому скінченному інтервалі. Тому в нерівності (11) (з $y_n = 0$) можна перейти до границі та отримати

$$\int_{-r}^r |u(s)|^2 ds \geq \delta.$$

Це означає, що $u \neq 0$.

Покажемо, що u належить E . Виберемо довільно $b > 0$. Тоді при достатньо великих n маємо

$$\int_{-b}^b \{|u'_n(s)|^2 + |u_n(s)|^2\} ds \leq \int_{-k_n}^{k_n} \{|u'_n(s)|^2 + |u_n(s)|^2\} ds \leq C$$

внаслідок обмеженості $\|u_n\|_{k_n}$. Оскільки $u_n \rightarrow u$ слабо в $H^1(-b, b)$, то

$$\int_{-b}^b \{|u'(s)|^2 + |u(s)|^2\} ds \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \{|u'_n(s)|^2 + |u_n(s)|^2\} ds \leq C.$$

Далі, оскільки b є довільним, то звідси випливає, що

$$\|u\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \{|u'(s)|^2 + |u(s)|^2\} ds \leq C < \infty,$$

тобто u належить E .

Залишилося перевірити, що u — розв'язок рівняння (2). Нехай $\phi(s)$ — довільна нескінченно диференційовна функція з компактним носієм $\text{supp} \phi(s) \subset [-b, b]$. При достатньо великому n інтервал $(-k_n + 1, k_n - 1)$ містить $[-b, b]$ і, отже, коректно визначено функцію $\phi_n \in E_{k_n}$, яка збігається з ϕ на $(-k_n, k_n)$. Оскільки u_n — критична точка функціонала J_k , то

$$\begin{aligned} 0 &= \langle J'_k(u_n), \phi_n \rangle = \\ &= \int_{-k_n}^{k_n} \{c^2 u'_n(s) \phi'_n(s) - c_0^2 A u_n(s) A \phi_n(s) - c_0^2 B u_n(s) B \phi_n(s) + a^2 u_n(s) \phi_n(s)\} ds - \\ &\quad - \int_{-k_n}^{k_n} \{f'(A u_n(s)) A \phi_n(s) + f'(B u_n(s)) B \phi_n(s) + g'(u_n(s)) \phi_n(s)\} ds = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-b}^b \{c^2 u'_n(s) \phi'(s) - c_0^2 A u_n(s) A \phi(s) - c_0^2 B u_n(s) B \phi(s) + a^2 u_n(s) \phi(s)\} ds - \\
&\quad - \int_{-b}^b \{f'(A u_n(s)) A \phi(s) + f'(B u_n(s)) B \phi(s) + g'(u_n(s)) \phi(s)\} ds.
\end{aligned}$$

У першому інтегралі правої частини цієї рівності можна перейти до границі при $n \rightarrow \infty$, оскільки $u_n \rightarrow u$ слабо в $H^1(-b, b)$. Згідно з теоремою вкладення, $u_n \rightarrow u$ рівномірно на $[-b, b]$. Тому і в другому інтегралі можна перейти до границі. Отже,

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{-b}^b \{c^2 u'(s) \phi'(s) - c_0^2 A u(s) A \phi(s) - c_0^2 B u(s) B \phi(s) + a^2 u(s) \phi(s)\} ds - \\
&\quad - \int_{-b}^b \{f'(A u(s)) A \phi(s) + f'(B u(s)) B \phi(s) + g'(u(s)) \phi(s)\} ds = \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \{c^2 u'(s) \phi'(s) - c_0^2 A u(s) A \phi(s) - c_0^2 B u(s) B \phi(s) + a^2 u(s) \phi(s)\} ds - \\
&\quad - \int_{-\infty}^{+\infty} \{f'(A u(s)) A \phi(s) + f'(B u(s)) B \phi(s) + g'(u(s)) \phi(s)\} ds = \langle J'(u), \phi \rangle.
\end{aligned}$$

Оскільки ϕ — довільна нескінченно диференційовна функція з компактним носієм і множина таких функцій є щільною в E , то $J'(u) = 0$. Це означає, що u — критична точка функціонала J і, отже, є розв'язком задачі, що розглядається.

Теорему 2 доведено.

Література

1. Бак С. М. Біжучі хвилі в ланцюгах осциляторів // *Мат. студ.* – 2006. – **26**, № 2. – С. 140–153.
2. Бак С. Н., Панков А. А. Бегущие волны в системах осцилляторов на двумерных решетках // *Укр. мат. вісн.* – 2010. – **7**, № 2. – С. 154–175.
3. Бак С. М. Існування дозвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці // *Мат. та комп'ютер. моделювання. Сер.: Фіз.-мат. науки: зб. наук. праць.* – 2014. – Вип. 10. – С. 17–23.
4. Бак С. М. Існування надзвукових періодичних біжучих хвиль в системі нелінійно зв'язаних нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці // *Мат. та комп'ютер. моделювання. Сер.: Фіз.-мат. науки: зб. наук. праць.* – 2015. – Вип. 12. – С. 5–12.
5. Бак С. М. Існування періодичних біжучих хвиль в системі нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці // *Мат. студ.* – 2011. – **35**, № 1. – С. 60–65.
6. Бак С. М. Існування періодичних біжучих хвиль в системі Фермі–Пасти–Улама на двовимірній ґратці // *Мат. студ.* – 2012. – **37**, № 1. – С. 76–88.
7. Бак С. М. Періодичні біжучі хвилі в дискретному рівнянні \sin -Гордона на двовимірній ґратці // *Мат. та комп'ютер. моделювання. Сер.: Фіз.-мат. науки: зб. наук. праць.* – 2013. – Вип. 9. – С. 5–10.

8. *Bak S. M.* Periodic traveling waves in chains of oscillators // *Commun. Math. Anal.* – 2007. – **3**, № 1. – P. 19–26.
9. *Gallavotti G.* The Fermi – Pasta – Ulam problem. A status report // *Lect. Notes Phys.* – Berlin: Springer, 2008. – 302 p.
10. *Feckan M., Rothos V.* Traveling waves in Hamiltonian systems on 2D lattices with nearest neighbour interactions // *Nonlinearity*. – 2007. – **20**. – P. 319–341.
11. *Friesecke G., Matthies K.* Geometric solitary waves in a 2D mass-spring lattice // *Discrete and Contin. Dynam. Systems*. – 2003. – **3**, № 1. – P. 105–114.
12. *Ioos G., Kirchgässner K.* Traveling waves in a chain of coupled nonlinear oscillators // *Commun. Math. Phys.* – 2000. – **211**. – P. 439–464.
13. *Lions P. L.* The concentration-compactness principle in the calculus of variation. The locally compact case, part 2 // *Ann. Inst. H. Poincaré, Anal. Non Linéaire*. – 1984. – **1**, № 4. – P. 223–283.
14. *Makita P. D.* Periodic and homoclinic travelling waves in infinite lattices // *Nonlinear Anal.* – 2011. – **74**. – P. 2071–2086.
15. *Pankov A.* Traveling waves and periodic oscillations in Fermi–Pasta–Ulam lattices. – London; Singapore: Imperial College Press, 2005. – 196 p.
16. *Willem M.* Minimax theorems. – Boston: Birkhäuser, 1996. – 162 p.

Одержано 12.05.15,
після доопрацювання — 05.03.17